



COVID-19, Booster-Empfehlungen 2023/24

Personengruppe	Österreich	Deutschland	Schweiz	Italien
Gesunde Menschen	ab 12 Jahren			Kokon-Strategie
Ältere Menschen	ab 60	ab 60	ab 65	ab 60
Gesunde Schwangere		kein Booster nach Grundimmunisierung bzw. nach 2 Impfungen und 1 Infektion	nach individueller Abklärung möglich	
Personen mit erhöhtem Risiko für schweren Verlauf*	ab 6 Monaten	ab 6 Monaten	ab 16 Jahren	ab 6 Monaten
Menschen in Pflegeeinrichtungen				
Gesundheitspersonal				
Sonstiges	„Bevorzugt empfohlen wird die Impfung ... Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Grundsätzlich kann jedoch jede*r, die*der sich schützen, möchte laut Zulassung ab dem Alter von 6 Monaten geimpft werden.“	„Zu Beginn der Impfsaison sollten sehr alte Menschen sowie Personen mit relevantem Risiko für schwere Erkrankung bei Infektion vorzugsweise geimpft werden. Für andere Bevölkerungsgruppen besteht derzeit keine Notwendigkeit zur Auffrischimpfung.“	„Allen Personen unter 65 Jahren ohne Risikofaktoren wird im Herbst/Winter keine Covid-19-Impfung empfohlen.“	„Eine bivalente Impfung wird empfohlen für alle Personen im Alter von 12 Jahren oder älter, die noch auf die erste Auffrischungsdosis warten, unabhängig vom Impfstoff, der zur Vervollständigung der Grundimmunisierung verwendet wurde.“

***Erhöhtes Risiko gilt für:** Trisomie 21 | respiratorische, kardiale, renale, endokrine, metabolische, neurologische, psychiatrische o. chronisch-entzündliche Grunderkrankungen, schwere (dekompensierte) Organerkrankungen | onkologische Erkrankung | Immundefekte, Immundefizienz oder immunsupprimierende Therapie, HIV-Infektion, Organ- oder Knochenmarkstransplantation, Autoimmunerkrankungen | Übergewicht (BMI ≥ 30)



Grippe-Impfung 2023/24

Personengruppe	Österreich	Deutschland	Schweiz	Italien
Gesunde Kinder und Jugendliche	ab 7. Monat bis 18 Jahre	Empfehlung für Personen in Gemeinschaftseinrichtungen; Kokon-Strategie	frühgeborene Kinder bis zwei Jahre, Kokon-Strategie	von 6 Monaten bis 6 Jahren
Gesunde Erwachsene		Kokon-Strategie	Kokon-Strategie, etwa bei Kontakt zu Säuglingen bis 7. Monat	
Ältere Menschen	ab 60 Jahren	ab 60 Jahren	ab 65 Jahren	ab 65 Jahren
Gesunde Schwangere			Gilt auch für Frauen, die zu Beginn der Epidemiezeit entbinden.	Gilt auch für Frauen, die zu Beginn der Epidemiezeit entbinden.
Personen mit erhöhtem Risiko für schweren Verlauf*	Gilt auch für deren Kontaktpersonen.			
Menschen in Gemeinschaftseinrichtungen	auch in Kinderbetreuung/ Schulen			
Gesundheitspersonal				
Personen mit viel Publikumskontakt	z. B. Gastronomie, Handel	Kokon-Strategie	Kokon-Strategie	Polizei + Feuerwehr!

***Erhöhtes Risiko gilt für:** chronische Lungen-, Herz-, Kreislauf-, Nieren- oder neurologische Erkrankungen, Stoffwechselkrankheiten (auch bei gut eingestelltem Diabetes mellitus) und Immundefekte | BMI \geq 30 | immunsuppressive Therapien, HIV-Infektion oder andere immunsuppressiven Erkrankungen | hospitalisierte Personen mit erhöhter Gefährdung für Influenza-Komplikationen | Stillende und Personen im Umfeld von Neugeborenen



RSV-Impfung 2023/24 (Respiratorisches Synzytial-Virus)

Österreich	Deutschland	Schweiz	Italien
ab 60 Jahren			
Schwangere: Impfung auf Wunsch zum passiven Schutz von Neugeborenen in 24. bis 36. SSW möglich. Off-Label-Use bei bei immunsupprimierten oder pulmonal vorerkrankten Personen auch vor 60. Lebensjahr nach genauer Nutzen-Risikoabwägung; zu wenige Daten verfügbar!			Anm.: Zulassung für Italien erfolgt, aber noch keine Empfehlung auf der Website des Gesundheitsministeriums

Erhöhtes Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs gilt für: schwere dekompensierte Organerkrankungen | onkologische Erkrankungen | Immundefekte, schwere respiratorische, kardiale, renale oder endokrine, metabolische, neurologische Grunderkrankungen | BMI \geq 30 | HIV-Infektion oder andere immunsuppressive Erkrankungen | in Alten- und Pflegeheimen betreute Personen